

**UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2**  
**Diplôme Interuniversitaire d'Acupuncture**

**Mémoire de fin d'études**

Indications des huit derniers points de *Zutaiyang* :  
Essai de synthèse didactique à partir d'un consensus  
historique

Présenté par  
**Le Docteur Marie-Christine MONFRAIX**  
Née le 05 octobre 1953  
A TOULOUSE

Enseignant responsable : Docteur CASTERA Philippe

**BORDEAUX - 2006**

# INTRODUCTION

---

Ce travail s'inscrit dans une dynamique de recherche instituée au sein du diplôme interuniversitaire d'acupuncture de l'université Victor Segalen Bordeaux 2, depuis 2001. L'instigateur de cette dynamique, le Docteur Philippe Castera, coordinateur du DIU, résume ainsi la problématique [1] :

« Depuis les origines jusqu'à nos jours, les meilleurs experts ont écrit des ouvrages donnant les indications des points d'acupuncture. De tous temps également, des acupuncteurs peut être moins brillants mais plus besogneux, ont cherché à faire des compilations de ces indications. Tous ces efforts conjugués font que nous sommes aujourd'hui face à un amalgame plus ou moins cohérent d'informations. Ceci n'est pas mémorisable en l'état. De nombreuses tentatives ont eu lieu pour sélectionner les indications les plus reconnues ou les plus logiques. Mais force est de constater que ceci a été opéré de façon subjective, selon des idées d'écoles ou « à la louche ». Quelques rares auteurs, qui se comptent sur les doigts d'une main, semblent plus rigoureux mais ne précisent pas la méthodologie utilisée. [2 ;3] »

Cinq mémoires ont déjà été réalisés avec les mêmes objectifs : *shoutaiyin* [4] ; *shouyangming* [5] ; *shoujueyin* [6] ; *shoushaoyin* [7] et les 15 premiers points de *zuyangming* [8]. Outre celui-ci, quatre autres sont en cours, et la totalité des points des méridiens devraient avoir été étudiés d'ici l'année 2010.

## OBJECTIFS

L'objectif de ce travail, réalisé dans le cadre du diplôme interuniversitaire d'acupuncture de l'Université Victor Segalen de Bordeaux 2, est triple :

- Méthodologique : sélectionner les indications selon une procédure objective rigoureuse et clairement explicitée, susceptible d'être critiquée par tout lecteur.
- Pédagogique : expliquer les indications retenues selon les théories les plus reconnues de la médecine traditionnelle chinoise.
- Didactique : présenter le travail de façon la plus lisible et la plus claire possible.

Ces objectifs seront appliqués aux points 60 à 67 de *zutaiyang*, dit de Vessie.

## METHODOLOGIE

La première étape consiste à faire une analyse systématique des indications retrouvées dans une quarantaine d'ouvrages classiques et modernes.

Les indications libellées parfois de façon légèrement différentes sont ensuite regroupées sous une seule appellation, lorsque ceci correspond à des traductions différentes d'un même symptôme traditionnel chinois.

Les indications non consensuelles sont celles citées par moins de 15% des auteurs historiques et/ou contemporains et sont éliminées.

Les indications retenues sont ensuite classées en 3 catégories :

- A- Consensus fort : citation par plus de 50% des auteurs.
- B- Consensus moyen : citation par 30 à 49% des auteurs.
- C- Consensus faible : citation par 15 à 29% des auteurs.

Les indications sont regroupées et expliquées selon les données les plus classiques de la médecine traditionnelle chinoise.

## PRESENTATION

Chacun des 8 points (du point 60 au point 67 du Méridien *Zutaiyang*) est abordé en trois chapitres :

- Analyse systématique des différents auteurs.
- Synthèse et sélection des indications, selon les principes établis dans la méthodologie.
- Commentaires. Essai d'explication des différentes indications.

# ETUDES DES POINTS

---

## 1- VE60 = Kunlun

### 1.1. Analyse systématique.

#### 1-1-1 Signes généraux

- Sudation abondante [15 ; 18 ; 33 ; 43] de la tête [13]
- Paludisme [10 ; 18 ; 51] avec sueur abondante [43]
- Fièvre intermittente [47] avec forte sudation ou sans sueur et froid [15 ; 33] ; sensation de frissons et fièvre [10 ; 18]
- Chaleur de la tête [15] avec vertige comme si les yeux allaient être arrachés [32]

#### 1-1-2 Neurologie

- Céphalées [3 ; 15 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 38 ; 43 ; 47 ; 49 ; 51] et vertiges [15 ; 46] avec contracture de la colonne dorsale [27] ; migraines fébriles : [45]
- Convulsions, épilepsies [3 ; 15 ; 18 ; 45] ; convulsions chez l'enfant [20 ; 28 ; 36 ; 43 ; 47 ; 50] avec contractures ou relâchement des membres [33] avec trismus : [13 ; 27 ; 32]
- Vertiges [15 ; 27 ; 32 ; 43 ; 46 ; 51]
- Apoplexie ; coma [46] ; syncope cadavérique (*jue*) [32] ; lipothymies [10 ; 13 ; 26] avec douleurs des yeux [33] ; étourdissements : [3]
- Eblouissements [28 ; 36] avec douleurs atroces [43], avec douleurs des yeux [33]
- Paralyse des membres inférieurs [44 ; 47 ; 50]
- Hémiplégie : membres faibles et douloureux [46]
- Toutes douleurs de spasmes, de convulsions des enfants [46]
- Poliomyélite infantile [51]

#### 1-1-3 Psychisme

- Démence, folie [13 ; 15] due à un grand vent, logorrhée [15] avec troubles visuels [13]
- Phobie du bruit [13]
- Nervosité [28]
- Tristesse [13]
- Insomnie par douleur morale ou mécontentement ou irritation ou douleur physique [46]

#### 1-1-4 Ophtalmologie

- Douleur vive des yeux (congestionnés ou enflés) [15 ; 32 ; 33 ; 46], à type d'arrachement [13]
- Vue trouble [18 ; 28] avec sensation d'avoir les yeux exorbités [26]
- Yeux exorbités [36]
- Affection des organes des sens [45]
- Amblyopie importante [15]
- Fragilité de l'œil au vent et au froid [15]

### 1-1-5 ORL

- Epistaxis [3 ; 13 ; 18 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 43 ; 46 ; 51], par chaleur à la tête [15 ; 27]
- Rhinorrhée [13 ; 32 ; 36]
- Eternuements [18]
- Oreille homolatérale : douleur [46]
- Obstruction nasale : [18]
- Affection des organes des sens : [45]
- Acouphènes : [28]

### 1-1-6 Stomatologie

- Douleurs des dents du maxillaire supérieur [13] ; douleurs aiguës des dents et des gencives homolatérales [46]
- Mâchoires serrées [13]
- Tout trouble de la dentition des bébés : douleurs, diarrhées [46]
- Caries dentaires [35]

### 1-1-7 Cardio-vasculaire

- Douleurs au cœur irradiant jusqu'au dos [10 ; 28 ; 33 ; 43 ; 46]
- Hypertension artérielle (maux de tête congestifs, nez saignant, hémorroïdes saignantes) [46] Hypertension artérielle [51]

### 1-1-8 Pneumologie

- Dyspnée [15 ; 20 ; 25 ; 32 ; 33 ; 36 ; 43 ; 46]
- Toux [13 ; 20 ; 28 ; 33] avec douleurs [32], avec éblouissements [36]
- Plénitude, distension thoracique [20 ; 27 ; 28]
- Expectoration [46]
- Asthme [33 ; 46]
- Poumons paralysés par spasmes, suffocation et congestion [46]

### 1-1-9 Digestif

- Estomac : douleurs, crampes, acidité [46], gastrite aiguë [45], douleurs au cœur ou épigastrique irradiant dans le dos [10 ; 28 ; 33 ; 43 ; 46]
- Douleurs, coliques, spasmes intestinaux [13 ; 15 ; 27 ; 46], avec irradiation lombaire [33], avec ballonnements [32]
- Engorgement et ballonnements abdominaux avec gêne respiratoire [15]
- Vomissements [32] ; Eructations [16]
- Béni béni [13 ; 46]
- Diarrhée et enflure des membres inférieurs [46], et douleurs du corps [15], diarrhée liquide, cholériforme : [27 ; 32]
- Hémorroïdes saignantes [46]
- Borborygmes [28]
- Gonflement soudain de l'abdomen [15 ; 32] ballonnement abdominal qui entraîne de la difficulté à respirer [15 ; 27]

- Constipation importante : [10 ; 15]
- Modification de la miction et de la défécation : [28]

#### 1-1-10 Uronéphrologie

- Inflammation de la loge rénale [33]

#### 1-1-11 Andrologie

- Douleur et enflure des parties génitales [20 ; 28 ; 33 ; 36 ; 38 ; 43 ; 46] de l'enfant [27 ; 32 ; 36]

#### 1-1-12 Gynécologie

- Stérilité [43] ; difficulté à concevoir [15 ; 27 ; 28]
- Douleur du vagin [43 ; 46] ou enflure ou prurit [46]
- Douleur aux règles [46]
- Maladies de l'utérus [45]

#### 1-2-13 Obstétrique

- Dystocie [3 ; 36 ; 43 ; 44 ; 45 ; 47 ; 50 ; 51] ; Rétention du fœtus, non délivrance : [15 ; 28 ; 33 ; 36]
- Le placenta ne descend pas [33 ; 43 ; 46 ; 47]
- Accouchement : atténue beaucoup les douleurs et diminue le nombre, fait venir l'enfant plus vite [46]

#### 1-2-14 Endocrinologie

- Toutes les affections glandulaires [43]
- Goitre [47]

#### 1-2-15 Métabolisme

- Œdème [25 ; 28 ; 35 ; 36]
- Spécial pour toutes les enflures [46] : organes sexuels ; peau ; lombes ; membres homolatéraux supérieurs et inférieurs

#### 1-2-16 Dermatologie

- Peau : tout prurit, toute enflure [46]
- Abscesses ou acné du dos, douleurs d'abscesses [46]
- Blessures, coups [46]
- Ganglions enflés et douloureux [46]
- Empoisonnement [46]
- Eruption cutanée en région dorsale [33]
- Urticaire [38]

## 1-2-17 Appareil locomoteur

- Douleurs fosses lombaires, coccyx [10 ; 15 ; 27 ; 36 ; 43 ; 46] ; lombalgies [3 ; 13 ; 44 ; 46 ; 49 ; 50 ; 51] avec impossibilité de se pencher en avant : [9 ; 33 ; 36] ou de se redresser [36] douleurs avec enflures, contractures [46]
- Contracture au dos et aux épaules [18 ; 20 ; 28 ; 33 ; 36 ; 43 ; 46 ; 49] avec spasmes [43] ; Douleur de l'articulation scapulo humérale [3 ; 46 ; 50 ; 51] ; pesanteur [27]
- Raideur du rachis [13 ; 15 ; 18] ; contractures [13 ; 18 ; 47 ; 51], pesanteur [13 ; 33]
- Algie du calcaneum ; talalgie [3 ; 33 ; 46 ; 49 ; 50 ; 51]
- Cervicarthrose [51] ; torticolis [3 ; 10 ; 15 ; 36] nuque raide [49] douleur de la nuque à type d'arrachement, contracture [13 ; 18]
- Sciatalgie [3 ; 44 ; 47 ; 50] ; fesse et cuisse très douloureuses comme par un coup de hache [43]
- Pieds : atrophie et crampes [32 ; 46] ; ne peuvent être posés à terre [33 ; 36 ; 46] comme éclatés [46] ; comme fendues [32] ; ou faiblesse, ne peut les relever, marche sans force, jusqu'à placidité [46 ; 51]
- Douleurs du rachis [28 ; 33 ; 46 ; 47]
- Douleurs du genou [27 ; 28 ; 33 ; 46]
- Douleurs de la cheville [33 ; 46] : comme fendue [28]
- Cou de pied : douleurs [33 ; 46 ; 44 ; 51]
- Sacrum et ischions : douleurs [46 ; 47 ; 49]
- Douleurs en général [45 ; 46] ; Spécial pour toutes les douleurs internes ou externes ; en général hémicorps homolatéral [46]
- Gonflement de la région lombaire et du coccyx, gonflement du coccyx et du dos, gonflement du talon et du mollet, gonflement du mollet [15 ; 16 ; 32] avec impossibilité de poser le pied par terre [32]
- Déformation du rachis en cyphose [28 ; 46]
- Dorsalgie avec impossibilité de se pencher, de se redresser [3 ; 18]
- Spasmes au mollet [43] ; Mollet : comme déchirés, enflé avec impossibilité de poser le pied par terre [33]
- Difficulté à la marche [27] ; Douleur qui survient dès que la jambe bouge [27]
- Atteinte de la région lombaire par le *Jiaoqi* (la maladie débute par l'œdème des pieds dû à l'eau- humidité avec enflure et douleur des membres inférieurs [33]. C'est le Bériberi.
- Douleur à la main [43]
- Spécial pour toutes les crampes et contractions [46]
- Faiblesse des tendons de la tête au pied [13]
- Arthrite aux malléoles et aux talons : « énergie dans le pied » [43]
- Plante : douleurs aiguës [46]

## 1.2.Synthèse et sélection des indications.

25 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 13 citations et au-delà, comme moyen de 9 à 12 citations et comme faible de 5 à 8 citations. Les indications citées par un à quatre auteurs sont retirées.

Signes	Niveau de consensus (nombre de citations)
<b>CONSENSUS FORT –A</b>	
Céphalées, notamment par chaleur à la tête	A(14)
Convulsions, épilepsies (notamment chez l'enfant)	A(14)
Raideurs et douleurs du rachis lombaire et du coccyx, avec difficulté à se pencher ou se redresser	A(14)
<b>CONSENSUS MOYEN –B</b>	
Epistaxis, notamment par chaleur à la tête	B(12)
Dystocie, accouchement difficile	B(12)
Contracture du dos et des épaules, scapulalgies	B(12)
Toux et dyspnée	B(10)
Douleurs et enflures des parties génitales, notamment chez l'enfant	B(9)
<b>CONSENSUS FAIBLE-C</b>	
Raideur et douleurs du rachis	C(8)
Douleurs des pieds, des chevilles, des genoux	C(8)
Raideur et douleurs du rachis cervical	C(8)
Paludisme, fièvres intermittentes	C(7)
Lipothymies, syncopes, coma, étourdissements	C(7)
Vertiges	C(6)
Talalgies	C(6)
Douleurs au cœur, à l'estomac, irradiant jusqu'au dos	C(5)
Sciatalgies	C(5)
Sudation abondante, sudation abondante de la tête	C(5)
Douleurs vives aux yeux	C(5)
Oedèmes	C(5)

**Tableau 1 : indications retenues pour VE60**

## 1.3.Commentaires [2].

- V60 : est situé entre le bord supérieur de la malléole externe et le bord interne du tendon d'Achille, au même niveau que la malléole.
- V60 : KUN LUN : il s'agit du point Jing proximal, Feu, du méridien zutaiyang, c'est un point important pour éliminer et faire descendre le vent, le feu et le yang en plénitude dans la partie supérieure du corps.
- En tant que point feu, V60 est capable d'éliminer la chaleur, le feu et l'excès de yang
- Le méridien zutaiyang (yang suprême) est le plus yang des six méridiens
- V60 est situé sur le pied, vers l'extrémité inférieure du méridien de la Vessie qui traverse la totalité de la face postérieure (yang du corps).
- V60 est capable : - d'éliminer la chaleur et de faire descendre l'excès de yang de la tête en cas de céphalée  
- de calmer le vent de la tête en cas d'épilepsie et de trismus

- Dans les raideurs et douleurs du rachis lombaire, dans lesquels le vide du rein constitue souvent la racine, on peut piquer V60 de façon à rejoindre Rn3
- En cas d'épistaxis : V60 élimine la chaleur et fait descendre l'excès de yang de la tête
- V60 a la capacité d'accélérer le travail de l'accouchement
- Indiqué pour la plénitude de la poitrine : en cas de dysphée et de toux
- V60 est utilisé dans le traitement de la douleur et de la contracture sur n'importe quelle portion du méridien.
- Point important pour la douleur et la raideur de la cheville et, comme de nombreux points distaux du méridien de la Vessie, il est capable de traiter la douleur du talon.
- V60 est utilisé pour traiter l'obstruction du méridien de la Vessie dans les membres inférieurs, en particulier la douleur sciatique qui irradie à l'arrière de la jambe.
- V60 : utilisé aussi pour éliminer la chaleur et faire descendre l'excès de yang de la tête en cas de douleurs vives aux yeux.

## 2- VE61 = pushen

### 2-1 analyse systématique

#### 2-1-1 Psychisme

- Hallucinations : [15 ; 45 ; 46] voit des fantômes [33 ; 43] ; propos incohérents [15 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36]
- Folie : [3 ; 43] calme [13 ; 33] causée par une révolte ou une répression du mouvement « terre » (rate) [33] avec protrusion de la langue et gonflement des joues [15 ; 46] avec stagnation des glaires [33]
- Divagation [43] ; Confusion, démence verbale [15]
- Paroles surexcitées, idées fausses ; bavardage [46]
- Inquiétude et douleur [32]

#### 2-1-3 Neurologie

- Pied paralysé : [15 ; 18 ; 33 ; 43] ; atrophie des pieds [13 ; 32]
- Béribéri [46 ; 47 ; 51] ; atrophie et faiblesse du membre inférieur : [3 ; 32 ; 44 ; 50 ; 51] avec perte de son contrôle moteur [33]
- Convulsions [33 ; 36] ; épilepsie [3 ; 15 ; 18 ; 33 ; 45 ; 51], dites du cheval [15] ; convulsions chez l'enfant de type cheval avec opisthotonos : [13 ; 32] ; convulsions dues à la peur [32] Convulsions dian-xian [45] avec protrusion de la langue et gonflement des joues [15 ; 32]
- Syncope cadavérique [15 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 43 ; 46]
- Lipothymie causée par une « révolte » [33] ou une répression du mouvement « terre » (rate) occasionnant 1 coma de type « cadavérique » ou folie (voit des fantômes) jiaqi avec enflure et douleur des genoux [15 ; 36 ; 47 ; 51] ; Chute avec perte de connaissance [13]
- Amyotrophie [51]
- Inversion et reflux du souffle, douleur et malaise [15]
- Céphalée [15] comme sensation d'une pierre [33]
- Crampes [3]

#### 2-1-4 Digestif

- Diarrhée cholériforme [15 ; 18 ; 20 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 46 ; 51] avec vomissements, crampes [20 ; 33 ; 43 ; 46] par reflux [36] à début brutal : [51] avec coliques spasmodiques : [28, 32 ; 33]
- Reflux [28 ; 33] ; vomissements [20 ; 33]

#### 2-1-5 Gynécologie

- Calme immédiatement les douleurs des règles [45]

#### 2-1-6 Appareil locomoteur

- Talalgie [3 ; 18 ; 25 ; 28 ; 32 ; 36 ; 43 ; 44 ; 45 ; 47 ; 50 ; 51] avec impossibilité de poser le pied au sol [28 ; 36]

- Enflure du membre inférieur [43] au genou [3 ; 28 ; 33 ; 43], du pied [28 ; 33]
- Douleur du pied [15 ; 45 ; 47]
- Lombalgie [47] avec impossibilité de se redresser et de se mouvoir [10] avec impossibilité de soulever une charge [13] avec atrophie des pieds qui ne peuvent plus être contrôlés [36]
- Douleur au genou [36] ; arthrite du genou [45]
- Douleur de la cheville [47] partie postérieure [15]
- Immobilité du corps [18]
- Dorsalgie [18]
- Energie dans le pied [43]

### 2-1-7 Autres

- Corps opposé : toute douleur (moins que V60) [46]

## **2-2 Synthèse et sélection des indications**

19 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 10 citations et au-delà, comme moyen de 6 à 9 citations et comme faible de 3 à 5 citations. Les indications citées par un ou deux auteurs sont retirées.

<b>Signes</b>	<b>Niveau de consensus (nombre de citations)</b>
<b>Consensus fort –A</b>	
Paralysie, atrophie du pied, du membre inférieur (béri béri)	A(12)
Talalgie avec impossibilité de poser le pied au sol	A(12)
Convulsions, épilepsies, avec tendance à la protrusion de la langue	A(11)
Syncopes cadavériques, lipothymies, avec tendance à la protrusion de la langue ( <i>jue</i> )	A(10)
Diarrhée cholériforme avec crampes, vomissements	A(10)
<b>Consensus moyen –B</b>	
Folie et hallucinations, propos incohérents, confus (tendance à la protrusion de la langue)	B(9)
<b>Consensus faible -C</b>	
Lombalgies	C(4)
Œdème des pieds, des genoux, des membres inférieurs	C(4)
Vomissements ; reflux	C(3)
Douleurs du pied	C(3)

**Tableau 2 : indications retenues pour VE61**

### **2-3- Commentaires [2]**

V61 : est situé 1,5 cm au dessous de la malléole externe, droit au dessous de KUN LUN (V60), sur l'arrière du calcaneum, à la jonction « de la chair blanche et de la chair rouge »

V61 : PUSHEN : il s'agit d'un point de réunion-hui des méridiens zutaiyang et yang qiao

Indications les plus fréquentes : - pathologie du pied

- convulsions, épilepsie
- perte de connaissance
- diarrhée cholériforme

### 3- VE62 = Shenmai.

#### 3-1 Analyse systématique

##### 3-1-1 Signes généraux

- Surmenage [28] ; fatigue générale [33 ; 43]
- Chaleur, chaleur extraordinaire, même dans l'ombre et la fraîcheur (disp) [46]
- Transpire de la tête (disp), ou froid intérieur, froid par extrême fatigue, frilosité (ton) [46]
- Fièvre des grandes fatigues [45] ; accès de frissons, de fièvre [13 ; 18]
- Maladie de froid –chaleur avec céphalée généralisée ou hémicrânie et anxiété [33]
- Chaud et froid, souffle localisé dans la couche épidermique [15]

##### 3-1-2 Psychisme

- Troubles psychiques [51]
- Folie [3 ; 43 ; 47] *dian-kuang* avec chute et perte de connaissance [13] *dian* [32 ; 49] dues au vent [49] ; schizophrénie [47]
- Excès : obsessions, refoulement de sentiments et d'idées, aide à s'extérioriser, à parler [46] ; délire par fièvre ou émotions [46]
- Insuffisance : lenteur et lassitude d'esprit, ne peut s'extérioriser, somnolence, vertiges [46]
- Anxiété (maladie froid-chaleur) [33]
- Sommeil : en cas de plénitude, aggravation la nuit, mieux au milieu du jour, avec insomnies [3 ; 46 ; 51]. Si insuffisance, sommeil lourd la nuit et agit comme une tasse de café [46]. Sans cause, tête comme embrumée, comme dans un bateau [46]

##### 3-1-3 Neurologie

- Céphalées [3 ; 28 ; 31 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 50 ; 51] d'étiologie vent avec éblouissement [43 ; 50] unilatérale ou médiane [28] unilatérale ou bilatérale avec angoisses [31] ; Tête : douleur aiguë, surtout au dessus des sourcils, en bosse. Maux de tête congestifs, migraines, douleurs externes de la tête [46]
- Convulsions ou épilepsie [3 ; 15 ; 18 ; 44 ; 46 ; 50 ; 51]
- Vertiges (*feng* à la tête) [3 ; 28 ; 33 ; 43 ; 46 ; 47 ; 49 ; 50 ; 51] ; de Ménière [50] ; éblouissement du au vent [33 ; 43 ; 46] ; avec folie *dian* [36]
- *Zhongfeng* : attaque directe par le vent [27 ; 40 ; 41 ; 46] ; hémiplégie [27 ; 40 ; 41] ; apoplexie [45 ; 46] ; opisthotonos correspond à une attaque directe par le vent, baisse de l'acuité visuelle [27] Attaque directe par le vent avec déviation de la bouche et des yeux et spasmes de l'hémiface [27] ; impotence fonctionnelle des quatre membres dans le *zhongfeng* ; déviation de la bouche et de l'œil [40 ; 41] ; paralysie faciale [47].
- Perte de connaissance [27 ; 40 ; 41] ; lipothymies [18]
- Parésie du membre inférieur [50] ; lassitude des membres inférieurs, Yeux révolvés [15]
- Aphasie [27 ; 40 ; 41] ; aphasie apoplectique [47] ; Difficulté d'élocution [40 ; 41]
- Méningite cérébro-spinale [47]

### 3-1-4 Ophtalmologie

- Baisse de l'acuité visuelle [40 ; 41]
- Douleurs des yeux du même côté [33] ; douleur des yeux [3 ; 15 ; 51]
- Irritation de l'œil commençant au cantus interne [1 ; 15 ; 32] ; conjonctivite [51]
- Révulsion oculaire [32]

### 3-1-5 ORL

- Epistaxis [31; 32; 43; 45] ininterrompu [15]
- Bourdonnements d'oreille [28 ; 31 ; 33 ; 43] ; oreille même côté : bourdonnements (ton) [46]
- Oreille du même côté : douleurs et saignements (disp)[46]

### 3-1-6 Stomatologie

- Dents : même côté : douleurs (surtout molaires) [46]
- Trismus [40 ; 41]

### 3-1-7 Cardiologie

- Palpitations [28 ; 47] : hypertension artérielle [51]

### 3-1-8 Digestif

- Estomac : crampes, spasmes [46]
- Déferlement énergétique avec sensation de froid à l'hypochondre et difficulté de plier le genou [33]

### 3-1-9 Uro-néphrologie

- Vessie : incontinence par sommeil très lourd (souvent spina-bifida) ⇒ disperser tous les soirs jusqu'à ce que le sommeil soit devenu léger et que le besoin réveille [46]
- Prostate et sphincter [46]

### 3-1-10 Gynécologie

- Douleurs dues à l'excès de sang et d'énergie, spasmes de l'utérus [46] ; douleurs avant et pendant les règles (dysménorrhée) [45] ; Troubles énergético-sanguins chez la femme, algoménorrhée [33] ; douleurs du qi et du sang chez la femme [28 ; 36 ; 49]
- Bouffées de chaleur et évidentes manifestations de ménopause (disp) [46]

### 3-1-11 Dermatologie – lymphatiques

- Dermite infectieuse de la face dorsale du pied ou de la main [27 ; 40 ; 41]
- Peau : acné, furoncles, clous (disp) prévient leur répétition (furonculose) corps (enflure) [46]
- Souffle localisé dans la couche épidermique, gonflement sous maxillaire [15]
- Prurit des mains et des pieds, avec impossibilité de saisir les objets [40 ; 41]

### 3-1-12 Endocrinologie

- Gonflement du cou [15]

### 3-1-13 Pneumologie

- Tuberculose, symptômes yin, frissons, sensation de l'énergie qui remonte, fièvre intermittente [43]
- Plénitude du thorax [28 ; 31]

### 3-1-14 Appareil locomoteur

- Raideur de la colonne dorsolombaire avec impossibilité de se pencher ou de se redresser [15 ; 27 ; 40 ; 41 ; 46]
- Raideur de la nuque [27 ; 33 ; 51] avec impossibilité de regarder en arrière [40 ; 41] ; torticollis [3]
- Lombalgies [27 ; 40 ; 41] avec raideur de la nuque [27], impossibilité de se retourner [27], avec douleurs de l'épaule et du dos [40 ; 41] ; et du membre inférieur [36 ; 40 ; 41] ; et cruralgie , irradiation à la cuisse [47 ; 50] ; due au *jiaqi* (béribéri) avec œdème [33] ; et douleur du pied [33] ; et douleur du mollet [13] ; avec impossibilité de se mouvoir [10 ; 15 ; 40 ; 41] ; douleur à la région rénale et au mollet, rhumatisme aux reins, contracture de la jambe, genou ou pied, ne peut fléchir le genou, atonie du pied [43] ; froid et bi des lombes et des hanches [28 ; 33]
- Dorsalgie [18]
- Déferlement énergétique avec sensation de froid à l'hypochondre et difficulté de fléchir le genou [33] ; difficulté de flexion-extension du membre inférieur [15 ; 25 ; 36 ; 49] ; contracture du genou et de la jambe avec impossibilité de se lever ou de s'asseoir [49] ; froid et lassitude du genou et de la jambe avec impossibilité de s'asseoir et de se relever [36]
- Impossibilité de lever le pied [18] ; rougeur et enflure du talon [22 ; 23] ; arthrite de la cheville [47] ; algie du cou de pied [50] ; gonflement [27 ; 28] ; rougeur et enflure [49] ; entorse, douleur et enflure [46]
- Arthralgies [46] ; dureté, contracturées, ankylosées ou relâchée [46] ; membres supérieurs [46] ; douleurs articulaires des membres [27] qui retentissent au niveau des lombes et des pieds [40 ; 41]
- Extrémités : automatisme troublé, maladresse, froid, douleur ou faiblesse [46]
- Membre inférieur : douleur, enflure (tous) jambes (région du Jambier avant) : engourdissement, ne peut rester longtemps debout, faiblesse [46]
- Froid au mollet avec impossibilité de rester longtemps debout [3 ; 10 ; 13 ; 20 ; 28 ; 32 ; 36]
- Engourdissement, absence de force [49]
- Froid et chaud dans la jambe [15]

### 3-2 Synthèse et sélection des indications

23 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 12 citations et au-delà, comme moyen de 7 à 11 citations et comme faible de 4 à 6 citations. Les indications citées par un à trois auteurs sont retirées.

Signes	Niveau de consensus (nombre de citations)
<b>Consensus moyen-B-</b>	
Céphalées	B (10)
Vertiges ( <i>feng</i> à la tête)	B (10)
Pied, cheville, talon : douleurs, enflure, entorses	B (9)
Folie, délires, obsessions	B (8)
Lombalgies irradiant aux membres inférieurs (sciatalgies, cruralgies...)	B (7)
Douleurs au genou ou au membre inférieur avec difficultés à fléchir et étendre le membre inférieur, difficultés à se lever et s'asseoir	B (7)
Froid au mollet avec difficultés à rester debout	B (7)
Convulsions, épilepsie	B (7)
<b>Consensus faible-C-</b>	
<i>Zhongfeng</i> , hémiplégie, apoplexie	C (6)
Dysménorrhées	C (6)
Raideur et douleurs de la nuque avec impossibilité de se retourner, de tourner la tête en arrière	C (6)
Raideur de la colonne dorsolombaire et douleurs avec impossibilité de se pencher ou de se redresser et de se mouvoir	C (5)
Epistaxis	C (5)
Acouphènes	C (5)
Perte de connaissance, lipothymies	C (4)
Aphasie, défaut d'élocution	C (4)
Douleurs des yeux	C (4)
Conjonctivite	C (4)

**Tableau 3 : indications retenues pour VE 62**

### 3-3 Commentaires [2]

- V62 : est situé sous le sommet de la malléole externe à 0,5 cm de son bord inférieur
- V62 : SHEN MAI
  - : il s'agit du point clef du méridien curieux yang qiao
- Le méridien zutaiyang est le plus superficiel des six méridiens et c'est généralement le premier à être envahi par le vent pathogène externe.
- On retrouve l'indication de V62 dans → les céphalées
  - les sensations vertigineuses
  - le trouble maniaque  
maniaco-dépressif
  - l'épistaxis
  - les acouphènes

- On peut piquer V62 : Shen Mai pour divers autres troubles qui touchent ne même temps le méridien de la Vessie et le vaisseau yang de la Motilité, par exemple douleur à la fois de la région lombaire (méridien de la Vessie) et de la hanche (vaisseau yang de la Motilité).
- V62 (point de confluence du vaisseau yang de la Motilité) est indiqué pour l'épilepsie diurne, alors que Rn6 (point de confluence du vaisseau yin de la motilité) est indiqué pour l'épilepsie nocturne.

## 4- VE63 = jinmen.

### 4-1 Analyse systématique

#### 4-1-1 Signes généraux

- Accès pernicieux [28] ; paludisme [43 ; 46] ; fièvre [51]
- Maladies chroniques évolutives du froid avec signes de chaleur et état fébrile journalier, permanent [33]
- Vessie : fièvre, (face rouge, surexcitation, transpiration abondante, douleurs aux lombes, vertiges) [46]

#### 4-1-2 Psychisme

- Folie [3 ; 33 ; 43] ; *dian* [32]
- Absences, distractions, enfants se frappant la tête contre les meubles ou le sol [46]

#### 4-1-3 Neurologie

- Céphalée [33] frontale d'origine vent [33 ; 43] avec éblouissement [33] ; au front [46]
- *Jue* cadavérique avec mort brutale [8 ; 13 ; 15 ; 32 ; 43 ; 51]
- Convulsions [3 ; 28 ; 33 ; 36 ; 46 ; 47] infantiles [33 ; 44 ; 45 ; 50 ; 51] ; épilepsie [3 ; 15 ; 18 ; 33 ; 43 ; 44 ; 45 ; 47 ; 50 ; 51] avec insuffisance du striopallidum [46] *dian-xian* [20] ; opisthotonos [28 ; 33 ; 36] ; spasmes des enfants [46]
- Tremblements empêchant de se tenir debout longtemps [33 ; 43]
- Enfants qui ouvrent la bouche avec balancement de la tête [28 ; 33 ; 36 ; 43]
- Tournent souvent la tête, avec la colonne vertébrale raide, en opisthotonos [3 ; 33]
- Atonie du genou [43] ; paralysie de la région de la rotule [46] ; engourdissement [46]
- Tête : tics, mouvements [46]
- Paralysie des membres inférieurs due à une infection vertébrale [45 ; 51] ; diminution de la force musculaire [51]

#### 4-1-4 Ophtalmologie

- Œil même côté : salle des larmes [46]

#### 4-1-5 Stomatologie

- Douleur dentaire [35]

#### 4-1-6 ORL

- Surdit  [43]
- Oreille m me cot  : bourdonnements ou douleurs, otite, saignement [46]
- Epistaxis [45]

#### 4-1-7 Digestif

- Diarrhée cholérique [15] avec coliques spasmodiques [28 ; 32 ; 33 ; 36], avec spasmes musculaires [15 ; 18 ; 33 ; 43]
- Spasmes au bas ventre [33 ; 43]
- Inflammation abdominale [43] ; péritonite [46]
- Vomissement et nausées [46] ; et diarrhée [45] et spasmes musculaires [33]
- Hernie brutale [20 ; 28 ; 33 ; 43] ; douleur herniaire [33]

#### 4-1-8 Appareil locomoteur

- Douleur du vertex et des épaules [9]
- Spasmes musculaires [43] ; crampes soudaines, du choléra [46]
- Lombalgie [3 ; 33 ; 44 ; 47 ; 51] avec irradiation à la cuisse [50]
- Douleur au genou et au mollet, tremblements empêchant de se tenir debout : [43]
- Genou, jambe antérieure, cou de pied : engourdissements [46]
- Lassitude du genou [33] douleur au genou et à la jambe [33]
- Douleur de la jambe [3 ; 32 ; 33 ; 44 ; 47 ; 51]
- Œdème des jambes [43]
- Douleur de l'articulation du cou de pied [44 ; 50]
- Douleur plantaire [47]
- Douleurs locales [3] ; douleur de la face postérieure de la cheville [35] ; entorses [15]
- Raideur de la nuque ou limitation des mouvements du cou [33]

### **4-2 Synthèse et sélection des indications**

19 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 10 citations et au-delà, comme moyen de 6 à 9 citations et comme faible de 3 à 5 citations. Les indications citées par un ou deux auteurs sont retirées.

<b>Signes</b>	<b>Niveau de consensus (nombre de citations)</b>
<b>Consensus fort -A-</b>	
Convulsions, épilepsie	A (14)
<b>Consensus moyen -B-</b>	
Diarrhée cholérique avec spasmes musculaires et intestinaux	B (7)
Lombalgies	B (6)
<i>Jue</i> cadavérique avec mort brutale	B (6)
Douleurs à la jambe	B (6)
Douleurs locales (cheville, pied)	B (6)
<b>Consensus faible -C-</b>	
Folie	C (4)
Enfants qui ouvrent la bouche avec balancement de tête	C (4)
Hernie brutale	C (4)
Lassitude des genoux et des mollets avec tremblement et impossibilité de rester longtemps debout	C (3)
Vomissements	C (3)
Céphalées	C (3)
Paludisme, accès pernicieux	C (3)

**Tableau 4 : indications retenues pour VE 63**

### 4.3 Commentaires [2]

- V63 : est situé en avant et au dessous de SHEN MAI (V62) dans le creux de latubérosité du cinquième métatarsien.
- V63 : Jingmen est le point xi de désobstruction du méridien zutaiyang. Les points xi sont des points où le qi et le sang, qui coulent relativement en surface le long des méridiens depuis les points puits (Jing), se rassemblent et plongent plus profondément, s'emploient dans le traitement des pathologies aiguës et de la douleur.
- Indication de V63 : l'épilepsie, les crampes, la douleur des articulations du « tigre blanc », forme d'obstruction douloureuse qui se caractérise par l'extrême intensité de la douleur, semblable à la morsure d'un tigre.
- En dépit de son statut de point xi du méridien de la Vessie, V63 Jingmen (comme la plupart des points distaux du méridien) traditionnellement ne se voit pas assigner d'action sur les troubles de la miction.

## 5- VE64 = jingu.

### 5-1 Analyse systématique

#### 5-1-1 Signes généraux

- Accès pernicieux, paludisme [32 ; 43 ; 46] avec frisson et fièvre [28 ; 33 ; 36], avec convulsions [46] ; le malade est tantôt yin (frissons), tantôt yang (fébrile) [43] ; fièvre intermittente [15 ; 47] avec chaud et froid [15] ; maladie de froid-chaueur avec fièvre et frilosité alternantes, périodiques [15 ; 33] ; frissons et fièvre [13], chaud et froid [15]
- Chaleur de la tête [32 ; 46] avec vertige [32]
- Crainte du froid dans le dos ; engourdissement du corps ; sudation sans crainte du froid [15]
- Pieds froids [13]

#### 5-1-2 Psychisme

- Folie [3], *dian* [13 ; 36], *dian kuang* [32]
- Emotivité, ne boit ni ne mange. Insanités, surexcitation [46]
- Troubles du comportement [13]
- Tendance à avoir peur [28 ; 33] par atteinte du froid-chaueur [33]
- Tendance à l'angoisse [19]
- Gémissements de tristesse [13]

#### 5-1-3 Neurologie

- Céphalée [3 ; 13 ; 15 ; 18 ; 28 ; 33 ; 36 ; 43 ; 44 ; 47 ; 50 ; 51] : à type de brisure [28 ; 33], atroce [33 ; 43 ; 51], congestive [46], avec rhinorrhée et épistaxis [36] ; lourdeur de la tête et pieds froids [47] ; tête lourde [15 ; 18] ; enflure douloureuse du vertex [13]
- Vertiges [13 ; 33 ; 36 ; 46] ; étourdissements [44] ; éblouissements [33 ; 43 ; 50]
- Lipothymies [13 ; 33 ; 36]
- Paralysie et atrophie des membres [13]
- Convulsions [13 ; 46], de la malaria [46]. Epilepsies [3 ; 15 ; 44 ; 47 ; 50 ; 51], atonique [15]
- Méningite [45 ; 46 ; 47 ; 50]
- Congestion cérébrale [46] ; hémiplégie [13]
- Ne peut lever les jambes [45 ; 51]
- Yeux réversés et opisthotonos [13] ; Révulsion oculaire [13 ; 28 ; 33]
- Tendance à hocher la tête [13]

#### 5-1-4 Ophtalmologie

- Le coin interne des yeux est enflammé [13 ; 28 ; 33 ; 46], avec des lésions voile blanc qui couvrent la conjonctive [46] ;
- Ulcération du canthus interne [33 ; 36]
- Trouble de l'acuité visuelle [51]
- Leucome [15 ; 33]
- Pterygion commençant pour le canthus interne [28 ; 32 ; 33 ; 46]

### 5-1-5 ORL

- Epistaxis [13 ; 15 ; 18 ; 28 ; 32 ; 43 ; 46 ], sans arrêt [13 ; 15 ; 28 ; 33 ; 43 ; 46], du à la présence de chaleur dans la tête [13]
- Nez surabondance de glaires [13 ; 32], mucus jaune (sinusite) [13 ; 15 ; 32 ; 45 ; 46] ou sec [46]
- Maux de gorge [45]
- Troubles de la respiration nasale [15] ; obstruction nasale [13 ; 18 ; 32]

### 5-1-6 Cardio-vasculaire

- Douleur au cœur [28 ; 33 ; 43 ; 46] avec éblouissement [43 ; 46]
- Myocardite [47 ; 50]
- Palpitations [32 ; 47] et angoisse [32]
- Affections cardiaques [45]

### 5-1-7 Digestif

- Le malade ne mange pas et ne boit pas [43] par émotivité [46] ; inappétence [13 ; 18 ; 19 ; 28 ; 32 ; 33] ; anorexie [33 ; 45]
- Dysphagie, douleurs épigastriques [33]
- Diarrhée liquide [13]
- Plénitude abdominale [13]

### 5-1-8 Particularités

- Se mort les joues [13 ; 46] les lèvres [15]

### 5-1-9 Appareil locomoteur

- Contractures musculaires [13 ; 32 ; 33 ; 43] ; crampes [3 ; 47]
- Douleur aux articulations, douleurs atroces de la région rénale, douleur au dos et aux cotés, impossibilité de courber le dos [46]
- Torticolis [3 ; 43] ; raideur de la nuque [13 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36] avec impossibilité de se retourner [36] ; contractures cervicales [46 ; 47 ; 50 ; 51]
- Déviation de la colonne vertébrale [43 ; 46] ; colonne vertébrale tous troubles et déplacements [46] ; cervico-dorsalgies [33] ; cou, nuque, dos, lombes homolaréaux : raideur, douleur [46] ; douleurs au dos [33 ; 43] , et froid [15] au cou [33 ; 43 ; 45], à la région rénale [33 ; 43], à la hanche [13 ; 32 ; 33 ; 43 ; 46] , au mollet [43], au pied [33 ; 43 ; 46]
- Douleur et raideur avec des difficultés d'extension et de flexion [15]
- Lombo sciatique [51] ; lombalgie [3 ; 44 ; 45 ; 50] et cruralgie [47] et difficulté de fléchir les lombes [15 ; 33] avec impossibilité de se pencher ou se redresser ou se mouvoir [10 ; 13 ; 15 ; 28 ; 33] à type de cassure [36]
- Douleur au genou [51]
- Contracture du pied [13 ; 18 ; 43 ; 51], œdème [35], difficile à étendre et à relever [46] froid [15], sécheresse et fissure des deux pieds [35]

### 5-1-10 Uronéphrologie

- L'émission d'urine goutte à goutte [32]

### 5-1-11 Dermatologie

- Dermite suintante et prurigineuse [35]
- Furoncles [35]

### 5-1-12 Pneumologie

- Halètement [18]

## **5-2 Synthèse et sélection des indications**

18 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 9 citations et au-delà, comme moyen de 6 à 8 citations et comme faible de 3 à 5 citations. Les indications citées par un ou deux auteurs sont retirées.

<b>Signes</b>	<b>Niveau de consensus (nombre de citations)</b>
<b>Consensus fort -A-</b>	
Céphalées, plutôt violentes	A (12)
Contractures et raideur cervicales, torticolis	A (11)
Lombalgies pouvant irradier dans le membre inférieur, et difficultés à se pencher, se redresser, se mouvoir	A (11)
Inappétence	A (9)
Paludisme, accès pernicieux, fièvre et frissons	A (9)
<b>Consensus moyen -B-</b>	
Convulsions, épilepsie	B (8)
Vertiges, éblouissements, étourdissements	B (7)
Epistaxis, sans arrêt	B (7)
Pathologie vertébrale (douleurs, contractures, déplacements, froid) avec irradiation à la hanche ou au pied	B (7)
Douleurs, contractures, oedème, froid du pied	B (7)
Contractures musculaires, crampes	B (6)
<b>Consensus faible -C-</b>	
Conjonctivite, ulcération du canthus interne	C (5)
Leucome, ptérygion commençant au canthus interne	C (5)
Rhinorrhée importante et purulente	C (5)
Douleurs au coeur	C (4)
Folie	C (4)
Méningite	C (4)
Obstruction nasale	C (4)
Se mort les lèvres, les joues	C (3)
Tendance à la peur, aux angoisses	C (3)
Lipothymies	C (3)
Yeux révolvés	C (3)

**Tableau 5 : indications retenues pour VE 64**

### 5-3 Commentaires [2]

- V64 = situé sous la tubérosité du cinquième métatarsien à la « jonction de la chair blanche et de la chair rouge ».
  
- V64 = JING GU
  - = il s'agit du point yuan du méridien zutaiyang
  - En tant que point yuan, il disperse les facteurs pathogènes et traite les affections le long du méridien.
  - Comme la plupart des points distaux du méridien, il traite la plénitude de la tête. Cette plénitude peut provenir :
    - D'une invasion de vent ou de vent-chaleur pathogène
    - D'une agitation du vent interne
    - D'une montée du yang due à un vide de rein
    - Ou d'un déséquilibre des parties supérieure et inférieure du corps.
      - La plénitude en haut se traduit par :
        - une chaleur
        - une chaleur et une lourdeur de la tête
        - un mal de tête atroce
        - un hochement de la tête
        - une rhinite avec epistaxis incessante
      - Tandis que le vide en bas se traduit par les pieds froids.
  - Le méridien principal de la vessie pénètre dans le cerveau tandis que le méridien divergent de la vessie pénètre dans le cœur ; cela se traduit, comme pour plusieurs points distaux du méridien par des indications comme :
    - les palpitations
    - la douleur du cœur
    - l'épilepsie
    - l'état maniaco-dépressif
  - Enfin, V64 est indiqué dans la raideur, douleur mais aussi dans la contracture le long du trajet du méridien de la vessie depuis le cou jusqu'au pied.

## 6- VE65 = shugu.

### 6-1 Analyse analytique

#### 6-1-1 Signes généraux

- Maladie pernicieuse [28 ; 32 ; 36] ; paludisme [43 ; 47]
- Syndrome grippal, fièvre [51] ; craint le vent [13 ; 18 ; 33] et le froid [13 ; 28 ; 33 ; 43]
- Douleur du corps [13 ; 18] et chaleur du corps [13]
- Amaigrissement important, fièvre intermittente partant des pieds [15]

#### 6-1-2 Psychisme

- Troubles psychiques [51] ; maladies mentales [47]
- Folie [3 ; 13 ; 15 ; 18 ; 28 ; 32 ; 33 ; 43 ; 50], agitée [3 ; 18 ; 32 ; 33] avec tendance à courir [13], *dianji* [13 ; 28]
- Démence, frayeurs répétées, logorrhée [15]
- Crise d'agitation, anxiété [51]
- Agitation en marchant [18]

#### 6-1-3 Neurologie

- Mouvement à l'intérieur de la peau (fibrillations) [46] ; trémulations musculaires [13 ; 28]
- Spasmes musculaires [13 ; 33]
- Epilepsie : [15 ; 18 ; 44 ; 47] ; convulsions [19 ; 36]
- Vertiges [19 ; 28 ; 32 ; 33 ; 44] avec lipothymie [19 ; 28 ; 32] ; étourdissements [3] ; éblouissements [33 ; 43 ; 50] avec corps chaud [33]
- Maladie brutale avec céphalée [13] ; douleur aigue du sommet de la tête et de la nuque [28 ; 47] ; douleurs de la tête à la défécation [32 ; 46]

#### 6-1-4 Ophtalmologie

- Conjonctivite de l'angle interne de l'œil [13 ; 15 ; 18 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 45], avec ulcération [13 ; 28 ; 32] ; conjonctivite aiguë [51]
- Conduit lacrymal (coin interne) contracté, enflé, obstrué ; larmes coulant sans arrêt [28 ; 46]
- Taie oculaire [47]
- Yeux jaunes [28] ; sclérotiques jaunes [33]

#### 6-1-5 ORL

- Surdité [13 ; 18 ; 28 ; 32 ; 33 ; 43 ; 45 ; 46]
- Otites collectées [45]
- Bourdonnements d'oreilles [36]

#### 6-1-6 Stomatologie

- Dents = douleurs aux incisives [46]

### 6-1-7 Digestif

- Diarrhée [13 ; 15 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 43 ; 46] ou occlusion avec douleurs aux lombes [46], dysentérieforme [13 ; 28]
- Hémorroïdes [33 ; 36 ; 43 ; 46]
- Rassemblement énergétique dans les intestins [33]

### 6-1-8 Uro-néphrologie

- Vessie irritation à inflammation (cystite) spasmes, besoins fréquents et urgents, calculs dans la vessie [46]

### 6-1-9 Dermatologie

- Furoncles et anthrax du dos [28 ; 36] ; abcès du dos [33 ; 43 ; 46]
- Abcès froids ou chauds, toutes sortes d'abcès [43 ; 46]
- Tumeur maligne, éruption cutanée au début en région dorsale [33]

### 6-1-10 Appareil locomoteur

- Torticolis [3 ; 33 ; 43 ; 45 ; 50], douleur au cou [33 ; 43] ; le malade a le cou raide et ne peut tourner la tête [13 ; 28 ; 36 ; 43] ; douleurs simultanées à la tête et à la nuque [47] ; nuque raide [32] ; nuque raide avec excès de vent [28] ; nuque opposée = muscles atrophiés [46] ; contracture cervicale et dorsale [51]
- Dorsalgie [3 ; 46]
- Douleur atroce à la région rénale et à la colonne vertébrale [43]
- Lombalgies (lombes comme brisés, cassés)[3 ; 13 ; 44 ; 45 ; 46 ; 50 ; 51] ; lombalgie insupportable [15] ; lombo-rachialgie, blocage de l'articulation coxo- fémorale, crampe dans le creux poplité, douleur du crâne, spasme musculaire [33] ; lombalgie avec impossibilité de se redresser ou de se mouvoir, corps plié [10]
- Sciatalgie [50] ; lombo-sciatique [51] ; lombalgie et gonalgie [36]
- Articulations raides, hanche raide, ne peut plier [28 ; 46] ; rhumatismes [45]
- Douleur à l'articulation de la hanche [13 ; 28 ; 43 ; 46] ; douleur de la partie supérieure de la hanche avec incapacité à la lever [15 ; 43] douleur qui remonte jusqu'à la hanche [32]
- Douleur de la jambe [3 ; 33 ; 44] face dorsale [51] ; mollet comme fissuré [13 ; 28]
- Nourure du creux poplité [28]
- Pied comme noué [13] ; ne peut plier [46] ; immobile [18] ; douleur et enflure de l'articulation avec chaleur du milieu de la plante du pied [35]
- Douleur du crâne des joues et du cou [33]

## 6-2 Synthèse et sélection des indications

18 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 9 citations et au-delà, comme moyen de 6 à 8 citations et comme faible de 3 à 5 citations. Les indications citées par un ou deux auteurs sont retirées.

Signes	Niveau de consensus (nombre de citations)
<b>Consensus fort-A-</b>	
Maladie mentale, folie	A(11)
Torticolis, raideur de la nuque empêchant de tourner la tête	A(11)
Lombalgies (lombes comme brisées, cassées)	A (10)
<b>Consensus moyen-B-</b>	
Conjonctivites +/- ulcérations du canthus interne	B (9)
Vertiges, éblouissements, étourdissements, avec lipothymies possibles	B (8)
Diarrhée	B (8)
Surdité	B (8)
Fièvre et frissons, craint le vent et le froid	B (6)
Convulsions et épilepsies	B (6)
Céphalées du vertex et à la nuque, notamment lors de la défécation	B (6)
Coxalgies	B (6)
Douleurs de jambe, mollet comme fissuré	B (6)
<b>Consensus faible-C-</b>	
Paludisme, accès pernicieux	C (5)
Abcès, furoncles du dos	C (5)
Hémorroïdes	C (4)
Trémulations, spasmes musculaires	C (4)
Pathologies du pied avec impotence	C (4)
Rhumatismes articulaires avec raideur	C (3)

**Tableau 6 : indications retenues pour VE 65**

## 6-3 Commentaires [2]

- V65 = situé en arrière et en dessous de la tête du cinquième métatarsien.
- V65 = SHU GU
  - Il s'agit du point « shu » « bois » du méridien zutaïyang.
  - En tant que point shu, il traite :
    - Les troubles du méridien
    - L'autre extrémité du méridien
    - La lourdeur du corps et les douleurs articulaires
  - Il disperse le vent pervers.

- Le méridien de la vessie monte du canthus interne au vertex, se relie, se relie à des points du vaisseau gouverneur et du méridien de la vésicule biliaire sur la tête et descend dans la région occipitale du cou.
- En conséquence, V65 SHU GU est indiqué pour :
  - La rougeur et la douleur des yeux et du canthus interne
  - La céphalée (surtout de la région occipitale)
  - La raideur du cou.L'action d'élimination de la chaleur qu'a V65 va jusqu'à :
  - Calmer la fièvre
  - Drainer la chaleur de la région anale dans le traitement des hémorroïdes.Comme V40, V65 est indiqué également pour :
  - Le furoncles enflés sur le dos.

## 7- VE66 = zutonggu.

### 7-1 Analyse systématique

#### 7-1-1 Signes généraux

- Accès de fièvre et de frissons [13 ; 15 ; 18] ; crainte du vent et du froid [15 ; 18]
- Accès pernicieux
- Absence de transpiration dans les maladies de la chaleur (*wenbing*) [32]
- Transpiration avec absence de crainte du froid [15]
- Douleur du corps [13 ; 18]

#### 7-1-2 Psychisme

- Anxiété [15 ; 51] ; peur [18 ; 33 ; 43] ; état craintif [15] ; tendance à sursauter [36] ; esprit tremblant, émotivité [46] ; sursauts fréquents avec spasmes [13 ; 28]
- Angoisse avec bâillements [15] ; bâillements nombreux [28 ; 32 ; 45] Aime s'étirer [33]
- Folie agitée [15] ; maladies mentales [47] ; troubles psychiques [51]

#### 7-1-3 Neurologie

- Céphalée [3 ; 15 ; 23 ; 36 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 50] ; avec troubles oculaires [47] ; avec difficulté d'avaler [45] ; tête lourde avec éblouissement [32 ; 33 ; 43 ; 50], avec vertiges et lipothymies [20 ; 28 ; 32] ; avec difficulté à avaler [45]
- Vertiges [15 ; 20 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 44 ; 46 ; 51], avec tête lourde et lipothymie [20 ; 28 ; 32] ; étourdissement [3] ; tête lourde et éblouissement [33 ; 43 ; 50]
- Lipothymie [15 ; 20 ; 28 ; 32 ; 36]
- Difficulté d'élocution et paralysie de la langue [13]

#### 7-1-4 Ophtalmologie

- Troubles de la vue [33 ; 43 ; 46] ; vue trouble [13 ; 15 ; 28 ; 36]
- Yeux rouges [23]

#### 7-1-5 ORL

- Epistaxis [3 ; 13 ; 18 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 44 ; 46 ; 47 ; 50 ; 51]
- Rhinorrhée séreuse [15 ; 28 ; 32 ; 36] avec épistaxis [18] ; coryza chronique, écoulement clair par accès, nez saignant [46]
- Gonflement de la base de la langue [13]
- Eternuements [33]
- Furoncle ou ulcération de la gorge [32]
- Hypersialorrhée [15]

#### 7-1-6 Pneumologie

- Toux fréquente [13] ; nausée et toux [18]

- Catarrhe de poitrine qui est en plénitude [43] ; plénitude thoracique due à une accumulation d'humidité [15 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36] ; engorgement thoraco-costal et bronchique [15]
- Dyspnée [47] avec reflux du qi [13]

#### 7-1-7 Digestif

- Indigestion [15 ; 43 ; 45 ; 46] avec impossibilité de bâiller [36] ; liquide de stase dans l'estomac, relâchement du sphincter anal [43] ; inflammation ancienne, glaires d'estomac, nourriture non digérée [46] ; ballonnement abdominal et inappétence [23] ; dyspepsie [33 ; 44 ; 50] ; anorexie [33 ; 45] ; céphalée avec difficulté à avaler [45]
- Douleur du petit intestin [33]
- Eructations fréquentes [18]
- Diarrhée cholériforme [33]

#### 7-1-8 Gynécologie

- Utérus : congestion [46]

#### 7-1-9 Dermatologie

- Eruption cutanée au début, en région dorsale (disp) [33]

#### 7-1-10 Appareil locomoteur

- Douleur de nuque [46] (congestion cérébrale) ; torticolis [3 ; 50] ; cervicalgie [33 ; 51] ; raideur douloureuse de la nuque [18 ; 28 ; 32 ; 36] à type d'arrachement avec rotation impossible [15]
- Douleurs vertébrales [45]
- Douleur des genoux : la douleur est comparable à une désarticulation du genou [18]

#### 7-1-11 Appareil cardio-vasculaire

- Palpitations [15 ; 32]
- Hypertension artérielle [15]

## 7-2 Synthèse et sélection des indications

17 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 9 citations et au-delà, comme moyen de 6 à 8 citations et comme faible de 3 à 5 citations. Les indications citées par un ou deux auteurs sont retirées.

Signes	Niveau de consensus (nombre de citations)
<b>Consensus fort-A-</b>	
Céphalée, tête lourde	A(14)
Vertiges, éblouissements, étourdissements	A (12)
Epistaxis	A (12)
Indigestion, inappétence, dyspepsie	A (10)
Torticolis, douleurs et raideurs de la nuque	A (10)
Anxieux, peureux, craintif, émotif, sursaute facilement, tremble	A (9)
<b>Consensus moyen-B-</b>	
Troubles de la vue, vision trouble	B (7)
Rhinorrhée claire	B (6)
Plénitude thoracique due à une accumulation d'humidité	B (6)
Vue trouble, trouble de la vue	B(6)
Vertiges	B(6)
<b>Consensus faible-C-</b>	
Lipothymie	C (5)
Angoissé avec bâillements fréquents, aime s'étirer	C (5)
Fièvre et frissons, crainte du vent et du froid	C (3)
Folie agitée, maladies mentales	C (3)

**Tableau 7 : indications retenues pour VE 66**

## 7-3 Commentaires [2]

- V66 = situé dans le creux en avant et en dessous de la cinquième articulation métatarso-phalangienne.
- V66 = ZU TONG GU
  - En tant que point Rong d'un méridien yang :
    - Il clarifie la chaleur
    - Traite l'autre extrémité du méridien
    - Traite les maladies yang.
  - Il disperse le vent pervers.
- V66 est le point eau du méridien eau de la vessie. Comme tous les points distaux du méridien de la vessie, sa principale action est d'éliminer de la tête le qi et le yang pathologiques qui montent.

## 8- VE67 = zhiyin.

### 8-1 Analyse systématique

#### 8-1-1 Signes généraux

- Frissons et fièvre [13 ; 32]
- Syndrome grippal [51]
- Accès pernicieux [10 ; 13 ; 20 ; 28 ; 36], avec discrète douleur corporelle [10], avec absence de transpiration [36] ; paludisme [18] yin sans sueur [43], algide [46]
- Intolérance aux vêtements [13 ; 18]
- Maladie du vent froid due à l'atteinte du petit orteil (*taiyang*) [33] ; maladie du froid de l'automne sans sueur [33]
- Absence de transpiration [13 ; 32]
- Sensation de malaise dans tout le corps [13]

#### 8-1-2 Psychisme

- Inquiétude [13] et nervosité avec chaleur sous les pieds [36]
- Surexcitation à insanité (troubles causés par les vers) [46]
- Tristesse (par maladie du froid de l'automne), nervosité [33]
- Folie *dian-kuang* [33]

#### 8-1-3 Neurologie

- Céphalée [3 ; 10 ; 13 ; 20 ; 36 ; 43 ; 45 ; 47 ; 49 ; 50], céphalée liée au vent et au froid [49] céphalée du vertex et douleur des épaules [10] ; tête lourde [18 ; 28 ; 41 ; 46], avec obstruction nasale [33]
- Nervosité à convulsions (troubles causés par les vers) [46]
- Attaque directe du vent [47]
- Parésie de la région irriguée par le *Zutaiyang*, de la tête au pied (maladie du vent froid du à l'atteinte du petit orteil) [32 ; 33]
- Absence de force des quatre membres [13]
- Syncope [50]

#### 8-1-4 Ophtalmologie

- Yeux jaunes et larmoyants [33]
- Affection des yeux [45]
- Douleur aux yeux [28 ; 33 ; 43 ; 46 ; 47 ; 50], au coin interne de l'œil [28 ; 33 ; 43], avec pterygions, taie [13 ; 15 ; 18 ; 28 ; 33 ; 35 ; 36 ; 43 ; 47]
- congestion, cataracte [46]
- Leucome [33]
- Conjonctivite [51]

### 8-1-5 ORL

- Obstruction nasale [3 ; 20 ; 28 ; 33 ; 36 ; 43 ; 50] et céphalée [20 ; 28] avec sensation de tête lourde [33]
- Nez opposé bloqué avec sensation de tête lourde [46]
- Coryza chronique, écoulement clair par aises [46] ; rhinorrhée séreuse [15 ; 28] ; rhume [18 ; 45 ; 51] avec bourdonnements [45]
- Surdit  [23 ; 28]
- Acouph nes [23 ; 28 ; 45]
- Epistaxis [3 ; 13 ; 18 ; 33 ; 47 ; 50] avec convulsions [13]
- Clarifie l' coulement nasal [47]
- Toute maladie se localisant   la face et au cr ne [33 ; 46]

### 8-1-6 Cardio-vasculaire

- Malaise au c ur [43]
- Hypotension (ton) hypertension (disp) [46]
- « Rhumatisme paralysant des vaisseaux » [46] ; maladie bi des vaisseaux avec douleur de la poitrine [33]

### 8-1-7 Pneumologie

- Douleur tant t   la poitrine, tant t aux flancs [43] ; douleurs thoraco-costales mobiles [15]

### 8-1-8 Parasitologie-digestif

- Dyspepsie [49]
- Vers parasites (intestins ou estomac, oxyures, lambliaose, et m me t nia etc.) toute vari t , les fait expulser le lendemain, et donne contre eux l'immunit  si renouvel  trois nouvelles lunes de suite. Tout trouble caus  par les vers (nervosit    convulsions, surexcitation, insanit , douleur d'abdomen, vertiges etc.) [46]
- Douleurs d'estomac [45 ; 46]
- Hernie [13], de type froid [18]
- H morroïdes [33]

### 8-1-9 Uron phrologie

- Dysurie [19 ; 28 ; 32 ; 33 ; 36 ; 43] ; troubles urinaires [15] ; r tention urinaire [45]
- Tonifieur de vessie...toute faiblesse, atonie, urine insuffisante ou arr t e (tonifie muscles expulseurs et rel che le sphincter v sical) ton-[46]
- Incontinence (muscles expulseurs trop forts et sphincter rel ch  (disp) [46]

### 8-1-10 Andrologie

- Spermatorrh e [15 ; 28 ; 36] nocturne [33 ; 43]

### 8-1-11 Gynécologie

- Règles ne venant pas par atonie des ovaires (ton), ou par spasmes avec douleurs (disp) [46]
- Aménorrhée et trouble de l'ovulation [33]

### 8-1-12 Obstétrique

- Pour la correction de la position vicieuse du fœtus [3 ; 43 ; 44 ; 47 ; 50 ; 51]
- Accouchement dystocique [3 ; 35 ; 43 ; 44 ; 45 ; 47 ; 50 ; 51]
- Rétention placentaire [3 ; 47 ; 50 ; 51]
- Utérus faible (ton) contracté (disp) [46 ; 50]
- Accélère l'accouchement [46]

### 8-1-13 Dermatologie

- Toutes sortes de plaies [43]
- Prurit généralisé [28 ; 47] ; affection prurigineuse – éruption cutanée en région dorsale [33]
- Furonculose des deux pieds [35]

### 8-1-14 Appareil locomoteur

- Douleurs de la nuque [13 ; 18] et raideur [49]
- Thorax et côtés : douleur en ceinture, sans endroits fixes [13 ; 15 ; 18 ; 32 ; 36 ; 46]
- Douleurs du dos, des lombes jusqu'au coccyx [46]
- Douleurs des lombes et des flancs qui se répandent [15]
- Enflure au genou et aux pieds [26 ; 33 ; 43] ; arthrite et œdème des pieds [35 ; 43 ; 45]
- Spasmes musculaires [33] ; crampes [20 ; 28]
- Vent froid partant du petit orteil et se transformant en bi mobile : [13 ; 15 ; 28 ; 32 ; 36]
- Chaleur à la plante du pied [3 ; 13 ; 18 ; 28 ; 32 ; 33 ; 43 ; 46 ; 50]

## **8-2 Synthèse et sélection des indications**

24 auteurs citent ce point. Le consensus est considéré comme fort à 12 citations et au-delà, comme moyen de 8 à 11 citations et comme faible de 4 à 7 citations. Les indications citées par un à trois auteurs sont retirées.

Signes	Niveau de consensus (nombre de citations)
<b>Consensus fort-A-</b>	
Céphalées et tête lourde	A (15)
<b>Consensus moyen-B-</b>	
Ptérygion, taie, leucome, cataracte (voile devant les yeux)	B (10)
Chaleur de la plante des pieds	B (9)
Obstruction nasale	B (8)
Dystocie	B (8)
Dysurie	B (8)
Paludisme, accès pernicieux	B (8)
<b>Consensus faible-C-</b>	
Douleurs aux yeux (surtout canthus interne)	C (6)
Coryza chronique, rhinorrhée claire	C (6)
Epistaxis	C (6)
Corrige la position vicieuse du fœtus	C (6)
Douleurs mobiles en ceinture du thorax et des côtés	C (6)
Spermatorrhée (nocturne)	C (5)
Arthrite et œdème des pieds	C (5)
Vent froid partant du petit orteil et se transformant en bi mobile	C (5)
Rétention placentaire	C (4)

**Tableau 8 : indications retenues pour VE 67**

### 8-3- Commentaires [2]

- V67 = situé sur le côté externe de l'extrémité du cinquième orteil, environ 0,1 mm en arrière du coin de l'ongle.
  - V67 = point Jing (puits) et le point métal du méridien de la vessie. Contrairement à la plupart des onze autres points Jing (puits), il ne possède pas d'action sur la restauration de la conscience en cas de coma ou de collapsus.  
Sa seule similitude avec les autres points Jing : éliminer la plénitude et la chaleur à l'extrémité opposée du méridien, au niveau de la tête : « troubles de la face et de la tête ».
  - V67 traite :
    - Les céphalées du vertex à l'occiput qu'elles soient dues à un vent pathogène externe ou à un déséquilibre interne
    - Les troubles du cou, des yeux, du nez et des oreilles.
    - La mauvaise position du fœtus = la principale indication : on traite en lui appliquant :
      - Un bâton de moxas des deux côtés pendant quinze à vingt minutes
      - Ou des cônes moxas (cinq à dix cônes sur chaque point).
- Et ce, une à deux fois par jour.  
C'est une pratique très courante en Chine, où l'on apprend aux femmes à se traiter elles-mêmes à leur domicile.  
Les résultats les meilleurs s'obtiennent lorsque le traitement est commencé au cours de la trente quatrième semaine.

Lorsque le fœtus s'est retourné, il faut arrêter la moxibustion, sinon le fœtus risque de se remettre dans la même position.

- Action sur l'utérus :
  - Provoque le travail retardé
  - Précipite l'accouchement
  - Favorise l'expulsion du placenta après l'accouchement.
- Indiqué dans les troubles de la miction : troubles urinaires douloureux ainsi que mictions difficiles ; mais en pratique, on utilise peu V67 à cet effet.
- V67 : en tant que dernier point du méridien de la vessie, il est particulièrement dynamique et sera plutôt utilisé dans les affections aiguës que chroniques.

## CONCLUSION

---

Ce travail axé sur les huit derniers points du méridien de vessie : zutaiyang, a permis dans un premier temps de dégager les indications les plus consensuelles pour chacun de ces points.

Dans un deuxième temps, cette sélection est analysée, cherchant à mieux comprendre le pourquoi de telles indications.

Cependant, les différentes étapes de cette approche ne verront leur pleine signification qu'à la lecture du travail entrepris par d'autres médecins sur l'ensemble des autres points : (V1 à V59) du méridien zutaiyang.

## BIBLIOGRAPHIE

---

- 1- Castera Ph. Indications des points de *shoutaiyin* : essai de présentation didactique à partir d'un consensus historique. Actes du congrès d'Acupuncture de Genève – 1 et 2 Octobre 2004.
- 2- Deadman P, Al-Khafaji M, Baker K. A manual of acupuncture. Hove (England) : Journal of Chinese Medicine Publications ; 1998.
- 3- Lu Jingda, Amnon Y. Les points d'acupuncture: leurs fonctions, indications et applications cliniques. Paris (France) : You Feng éditeurs ; 1996.
- 4- Thèvenot JM. Analyse et synthèse des points de *shoutaiyin*, Méridien du Poumon [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2002.
- 5- Covin J. Indications des points d'acupuncture du Méridien du Gros Intestin [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2003.
- 6- Kaddouri Said. Indications des points de *shoujueyin* : essais de synthèse didactique à partir d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2004.
- 7- Picoulet L. Indications des points de *shoushaoyin* : essai de synthèse didactique à partir d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2004.
- 8- Perrin L. Indications des quinze premiers points de *zuyangming* : essai de synthèse didactique d'un consensus historique [Mémoire] : Université Bordeaux 2 ; 2005.
- 9- Guillaume G, March Chieu. Dictionnaire des points d'acupuncture. Paris (France) : Guy Trédaniel éditeurs ; 1995.

### **Références historiques : du plus ancien au plus récent.**

10- X. *Neijing Suwen Lingshu*.

11- X. *Shen nong ben cao jing* (Herbier classique de Shen Nong), sous les Han.

12- X. *Biao you fu* (Ode pour élucider les mystères). Mentionné pour la première fois dans le Guide d'acupuncture et moxibustion en 241.

13- Huang Fu Mi. *Zhen jiu jia yi jing* (Classique systématique d'acupuncture et moxibustion). Publié en 282.

14- Ge Hong. *Zhou hou bei ji fang* ou *Zhou hou fang* (Manuel de prescriptions d'urgence). Publié entre 281 et 341.

15- Sun Si Miao. *Qian jin yao fang* (formule valant mille ducats) (625) et *Qian jin yi fang* (supplément aux formules valant mille ducats) (682).

16- Wang Tao. *Wai tai mi yao* (Secrets d'un fonctionnaire de la frontière). Publié en 752.

17- Wang Bing. *Huang di nei jing su wen ling shu* (Classique de médecine interne de l'empereur jaune. Fini de compilé en 762).

18- Tamba Yasuyori. *Ishimpo*. 10ème siècle.

- 19- Wang Huai Yin. *Tai ping sheng hui fang* (Prescriptions de sagesse de l'ère Taiping). Publié en 992.
- 20- Wang Wei Yi. *Tong ren shu xue zhen jiu tu jing* ( Manuel illustré des points d'acupuncture et de moxibustion sur la statuette de bronze. Publié en 1027.
- 21- Wang Zhi Zhong. *Zhen jiu zi sheng jing* (Expérience de thérapie d'acupuncture et moxibustion). Publié en 1220.
- 22- X. *Yu long ge* (Chant du dragon de jade). Mentionné pour la première fois dans le Guide spirituel de Bian Que pour l'acupuncture et la moxibustion, de Wang Guo Rui, publié en 1329.
- 23- Wang Guo Rui. *Yu long jing* ou *Bian Que shen ying zhen jiu yu long jing* (Guide spirituel de Bian Que pour l'acupuncture et la moxibustion ). Publié en 1329.
- 24- Teng Hong et al. *Pu Ji Fang* (Recettes à soulagement universel). Publié en 1406.
- 25- X. *Ling guang fu* (Ode à l'éclat spirituel). Mentionné pour la première fois dans la Collection complète d'acupuncture et moxibustion (*xu feng*) publié environ en 1439.
- 26- X. *Xi hong fu* (Ode de Xi Hong). Mentionné pour la première fois dans la Collection complète d'acupuncture et moxibustion, publiée vers 1439.
- 27- Xu Feng. *Zhen jiu da quan* (Collection complète d'acupuncture et moxibustion). Publié vers 1439.
- 28- Gao Wu. *Zhen jiu ju ying* ( Collection précieuse d'acupuncture et moxibustion). Publié en 1529.
- 29- X. *Yu long fu* (Ode du dragon de jade). Mentionné pour la première fois dans la Glorieuse anthologie d'Acupuncture et moxibustion (*Zhen jiu ju ying qi*) de Gao Wu, en 1529.
- 30- Gao Wu. *Bai zheng fu* ( Ode aux cent symptômes). Publié en 1529.
- 31- X. *Lan jiang fu* (Ode de la rivière obstruée). Mentionné pour la première fois dans la Glorieuse anthologie d'acupuncture et moxibustion de Gao Wu, en 1529.
- 32- Li Yan. *Yi xue ru men* (Introduction à la médecine). Publié en 1575.
- 33- Yang Ji Zhou. *Zhen jiu da cheng* (Grand compendium d'acupuncture et moxibustion). Publié en 1601.
- 34- X. *Tong xuan zhi yao fu* (Ode de l'essentiel de la connaissance). Mentionné pour la première fois dans le Grand compendium d'acupuncture et moxibustion de Yang Ji Zhou, publié en 1601.
- 35- Yan Zhen. *Xun jing* (1620 ?).
- 36- Zhang Jie Bin. *Lei jing tu yi* (Supplément illustré du classique des catégories). Publié en 1624.
- 37- X. *Tian yan tai yi ge* ou *tai yi ge* . Cité pour la première fois dans le *Lei jing tu yi* publié en 1624.
- 38- Qi Kun. *Wai ke da cheng* (compendium des maladies externes). Publié en 1665.
- 39- Zhu Quan. *Quan Kun Sheng yi* (époque Ming).
- 40- Wu Qian. *Yi Zong Jin Jian* (Miroir d'or de la médecine) (1742).
- 41- Zhang Jing. *Ci jing jie fa* ou *Jie fa*. Publié en 1876.
- 42- X. *Zhen jiu jie jing* .

**Références contemporaines:** *du plus ancien au plus récent.*

- 43- Chamfrault A. Traité de médecine chinoise. Coquemard éditeurs; 1964.
- 44- X. Précis d'acupuncture chinoise de Pékin. Académie de MTC de Pékin ; 1977.
- 45- Duron, Laville-Mery, Borsarello. Bioénergétique et médecine chinoise. Maisonneuve éditeurs ; 1978.
- 46- Soulié de Morant G. L'acupuncture chinoise. Maloine éditeurs ; 1979.
- 47- Roustan C. Traité d'acupuncture de l'Université de Shanghai. Masson éditeurs; 1979.

- 48- Kespi JM. Acupuncture. Maisonneuve éditeurs ; 1982.
- 49- Liu Jie Sheng. *Tai yi shen zhen*. 1983.
- 50- Nguyen VN. Médecine traditionnelle chinoise. Nguyen Van Nghi éditeurs ; 1984.
- 51- Zhang RF, Wu RF. Les points d'acupuncture et leurs mécanismes d'action. Masson éditeurs ; 1992.

# Diplôme interuniversitaire d'acupuncture

Université Victor Segalen Bordeaux 2

2006

Nom : MONFRAIX

Prénom : Marie-Christine

Adresse : 8, allée des ramiers 31520 Ramonville St Agne

Titre du mémoire : « Indications des huit derniers points de *zutaiyang*: essai de synthèse didactique à partir d'un consensus historique ».

## Résumé :

Ce travail s'inscrit dans une dynamique de recherche instituée au sein du diplôme inter-universitaire d'acupuncture de l'Université Victor Segalen Bordeaux 2, depuis 2001.

L'objectif de ce travail est triple :

- Méthodologique : sélectionner les indications selon une procédure objective rigoureuse et clairement explicitée, susceptible d'être critiquée par tout lecteur.
- Pédagogique : expliquer les indications retenues selon les théories les plus reconnues de la médecine traditionnelle chinoise.
- Didactique : présenter le travail de la façon la plus lisible et la plus claire possible.

Cet objectif est appliqué ici aux huit derniers points du Méridien *zutaiyang*, dit de Vessie.

Date et lieu de thèse : Mai 1983 à Toulouse

Date de naissance : 5 octobre 1953